



“È il piacere di **condividere**, il desiderio di **confrontarsi**,
l'aspirazione di **crescere insieme**, il coraggio di **misurarsi** su temi scottanti,
la nostalgia di **ritrovarsi**, la curiosità di **conoscere** il territorio,
il gusto di provare **nuove esperienze** sensoriali.
La speranza di riuscire a raccontare una **pediatria differente...**”

L'Orticaria Acuta, Le Bandierine Rosse e i dettagli curiosi

Stefano Miceli Sopo

16/19 Maggio 2024

Creature senza voce

Bambini migranti
nel Canale di Sicilia

SIRACUSA

L'orticaria acuta è definita come la comparsa di pomfi, angioedema o entrambi per 6 settimane o meno. La forma spontanea, spesso para-infettiva, non richiede accertamenti di routine. Come fare tuttavia a capire che appunto non è sospettabile una causa “pericolosa”? Di solito, i sospetti si appuntano sugli alimenti. In tal caso, possiamo utilizzare dei segnali di allarme (della cui elaborazione mi assumo la totale responsabilità).

Le B.R. - Bandierine Rosse (se il sospettato è un alimento)

- La reazione orticarioide dura poche ore (diciamo al massimo 6, in caso di angioedema fino a 24 ore) in assenza di trattamento farmacologico e non recidiva in assenza di un nuovo contatto con un potenziale agente inducente
- La reazione orticarioide avviene di solito entro pochi minuti (diciamo al massimo 60) da un contatto con un alimento potenzialmente sospettabile
- La reazione orticarioide è accompagnata dal coinvolgimento di altri organi (respiratorio, cardiovascolare, neurologico, gastrointestinale)
- Sono individuabili cofattori di rischio per anafilassi (sforzo fisico, freddo, assunzione di ac. acetilsalicilico, alcool) presenti nelle 4 ore precedenti e/o seguenti l' esordio dell' orticaria acuta.

Nel caso fossero assolti il punto 1 più uno o più dei punti 2, 3 e 4 si dovrebbe indagare ulteriormente una possibile genesi allergica o comunque potenzialmente fatale.

Altrimenti si può non far nulla.

Compresi certamente nelle B.R. sono “*I Dettagli Curiosi*”. Tra quelli più ingannevoli vi sono l' orticaria da contatto e l' allergia a soglia elevata (ex-FDEIA). Queste due sottospecie di allergia alimentare IgE-mediata possono trarre in inganno. “Se li conosci li riconosci” e noi cercheremo di fornire tutti gli elementi utili per conoscerle con l' aiuto delle storie di Elaisa e di Flavia.



Promotore Scientifico

SIMPE
SOCIETÀ ITALIANA MEDICI PEDIATRI



Mail

info@narrazionecircolare.org
comitato@narrazionecircolare.org
iscrizioni@narrazionecircolare.org



Telefono

+39 388 956 1306



“È il piacere di **condividere**, il desiderio di **confrontarsi**,
l'aspirazione di **crescere insieme**, il coraggio di **misurarsi** su temi scottanti,
la nostalgia di **ritrovarsi**, la curiosità di **conoscere** il territorio,
il gusto di provare **nuove esperienze** sensoriali.
La speranza di riuscire a raccontare una **pediatria differente...**”

L'Orticaria Acuta, Le Bandierine Rosse e i dettagli curiosi

Stefano Miceli Sopo

16/19 Maggio 2024

Creature senza voce

Bambini migranti
nel Canale di Sicilia

SIRACUSA

L' ASMA ACUTO - I dettagli curiosi

- Possibile che ad un ragazzo con asma acuto si possa arrivare a dare 12 spruzzi di salbutamolo? Forse sì.
- È ben fondato, per il paziente pediatrico con asma intermittente, lo slogan “Mai più salbutamolo senza cortisone per via inalatoria di accompagnamento?” Forse no.

Risponderemo a questi due interrogativi rispettando il dettato dei documenti che possono, a ragione, fregiarsi del titolo di linea guida. In particolare, quelli riguardanti l' asma.



Promotore Scientifico

SIMPE
SOCIETÀ ITALIANA MEDICI PEDIATRI



Mail

info@narrazionecircolare.org
comitato@narrazionecircolare.org
iscrizioni@narrazionecircolare.org



Telefono

+39 388 956 1306